局方發揮

雜類名方

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

局方發揮

朱震亨撰

本館據古今醫統正
脈全書本排印初編
各叢書僅有此本

局方發揮

局方發揮

元　金華朱丹溪　撰

和劑局方之爲書也。可以據證檢方。即方用藥。不必求醫。不必脩制。尋贖見成丸散。病痛便可安堂。仁民之意。可謂至矣。自宋迄今。官府守之以爲法。醫門傳之以爲業。病者恃之以立命。世人習以成俗。然予竊有疑焉。何者。古人以神聖工巧言醫。又曰醫者意也。以其傳授雖的。造詣雖深。臨機應變。如孫吳之將。操舟之工。自非盡君子隨時反中之妙。寧無愧於醫乎。今乃集前人已效之方。應今人無限之病。何異刻舟求劍。按圖索驥。冀其偶然中病難矣。

或曰。仲景治傷寒。著三百一十三方。治雜病。著金匱要略曰二十有三門。歷代名方。汗牛充棟。流傳至今。明效大驗。顯然耳目。今吾子致疑於局方。無乃失之謬妄乎。

予曰。醫之視病問證。已得病之情矣。然病者一身。血氣有淺深。體段有上下。臟腑有內外。時月有久近。形志有苦樂。肌膚有厚薄。能毒有可否。標本有先後。年有老弱。治有五方。令有四時。某藥治某病。某經用某藥。孰爲正治。反治。孰爲君臣佐使。合是數者。計較分毫。議方治療。貴乎適中。今觀局方。別無病源議論。止於各方條述證候。繼以藥石之分兩脩製藥餌之法度。而又勉其多服常服久服。殊不知。方通治諸病。似乎立法簡便。廣絡原野。冀獲一二。寧免許學士之誚乎。仲景諸方。實萬世醫門之規矩準繩也。後之欲

爲方圓平直者。必於是而取則焉。然猶設爲問難。藥作何應。處以何法。許學士亦曰。我善讀仲景書而知其意。然未嘗全用其方。局方制作。將擬仲景耶。故不揣荒陋。敢陳管見。倘蒙改而正諸。實爲醫道之幸。今世所謂風病。大率與諸痿證衰同論治。良由局方多以治風之藥。通治諸痿也。古聖論風論痿。各有篇目。源流不同。治法亦異。不得不辨。按風論。風者百病之長。至其變化乃爲他病。又曰。善行數變。曰因於露風。曰先受邪。曰在腠理。曰客曰入曰傷。曰中歷陳五臟與胃之傷。皆多汗而惡風。其發明風邪。係外感之病。有臟腑內外。虛實寒熱之不同。若是之明且盡也。別無癱瘓痿弱。卒中不省。僵仆喎斜。攣縮眩運。語澁不語之文。新舊所錄治風之方。凡十道。且卽至寶丹。靈寶丹。論之曰。治中風不語。治中風語澁。夫不語與語澁。其可一例看乎。有失音不語。有舌強不語。有神昏不語。有口禁不語。有舌縱語澁。有舌麻語澁。治大腸風祕。祕有風熱。有風虛。曾謂一方可通治乎。又曰。治口鼻血出。夫口鼻出血。皆是陽盛陰虛。有升無降。血隨氣上。越出上竅。法當補陰抑陽。氣降則血歸經。豈可以輕揚飛竄之腦麝。佐之以燥悍之金石乎。又曰。治皮膚燥痒。經曰。諸痒爲虛。血不榮腠腧。所以痒也。當與滋補藥以養陰血。血和腠潤。痒自不作。豈可以一十七兩重之金石。佐以五兩重之腦麝香桂。而欲以一兩重之當歸和血。一升之童便活血。一升之生地黃汁生血。夫枯槁之血。果能和而生乎。果能潤澤腠肉之乾瘦乎。又曰。治難產死胎。血脉不行。此血氣滯病也。又曰。治神昏恍惚。久在床枕。此血氣虛弱也。夫治血以血藥。治虛以補藥。彼燥悍香竄之劑。固可以刮滯氣。果可以治血而補虛乎。潤體丸等三十餘方。皆曰治諸風。治一切風。治一應風。治男子三十六

種風，其爲主治甚爲浩博。且寒熱虛實判然迥別。一方通治果合經意乎。果能去病乎。龍虎丹排風湯俱係治五臟風而排風又曰風發。又似有內出之意。夫病既在五臟。道遠而所感深。一則用麻黃三兩以發其表。一則用腦麝六兩以瀉其衞而謂可以治臟病乎。借曰在龍虎則有寒水石一斤以爲鎭墜。在排風則有白朮當歸以爲補養。此殆與古人輔佐因用之意合。吁。臟病屬裏而用發表瀉衞之藥。寧不犯誅伐無過之戒乎。寧不助病邪而伐根本乎。骨碎補丸治肝腎風虛。乳香宣經丸治體虛。換腿丸治足三陰經虛。或因感風而虛。或因虛而感風。既曰體虛。肝腎虛。足三陰經虛。病非輕小。理宜補養。而自然銅。半夏。威靈仙。荊芥。地龍。川練。烏藥。防風。牽牛。靈脂。草烏。羌活。石南。天麻。南星。檳榔等疏通燥疾之藥。居補劑之大半。果可以補虛乎。七聖散之治風濕流注。活血應痛丸之治風濕客腎經。衞汗以散風。導水以行濕。仲景法也。觀其用藥。何者爲散風。何者謂行濕。吾不得而知也。三生飲之治外感風寒。內傷喜怒。或六脉沉伏。或指下浮盛。及痰厥氣虛。大有神效。治外感以發散仲景法也。治內傷以補養東垣法也。誰能易之。脉之沉伏浮盛。其寒熱表裏虛實之相遠。若水火然。似難同藥。痰厥因於寒。或能成功。血氣虛者。何以收救。已上諸疑。特舉其顯者耳。若毫分縷析。更僕未可盡也。姑用寘之忘言。

或曰。吾子謂內經風論主於外感。其用麻黃桂枝烏附輩。將以解風寒也。其用腦麝威靈仙黑牽牛輩。將以行凝滯也。子之言過矣。

予應之曰。風病外感。善行數變。其病多實少虛。發表行滯有何不可。治風之外何爲。又歷述神魂恍惚。起

便須人手足不隨。神志昏憒。癱瘓癲曳。手足筋衰。眩運倒仆。半身不遂。腳膝緩弱。四肢無力。顫掉拘攣。不語語澁。諸痿等證。悉皆治之。攷諸痿論。肺熱葉焦。五臟因而受之。發爲痿躄。心氣熱生脉痿。故脛縱不任地。肝氣熱生筋痿。故宗筋弛縱。脾氣熱生肉痿。故痹而不仁。腎氣熱生骨痿。故足不任身。又曰諸痿皆屬於上。謂之上者。指病之本在肺也。又曰昏惑曰癡瘂曰瞀悶曰瞀昧曰暴病曰癰冒曰矇昧曰暴瘖曰瞀癒。皆屬於火。又曰四肢不舉。曰舌本強。曰足痿不收。曰痰涎有聲。皆屬於上。又禮記註曰。魚肉。天產也。以養陽。作陽德以爲倦怠。悉是濕熱內傷之病。當作諸痿治之。何局方治風之方。兼治痿者十居其九。不思諸痿皆起於肺熱。傳入五臟。散爲諸證。大抵只宜補養。若以外感風邪治之。寧免實實虛虛之禍乎。

或曰。經曰諸風掉眩。皆屬於肝。諸暴強直。皆屬於風。至於掉振不能久立。善暴僵仆。皆以爲木病。肝屬木。風者木之氣。曰掉。曰振。非顫掉乎。曰眩。非眩運乎。曰不能久立。非筋衰乎。非緩弱無力乎。曰諸暴強直。非不隨乎。曰善暴僵仆。非倒仆乎。又曰瞀悶。曰瞀昧。曰暴病。曰癰冒。曰矇昧。暴瘖。曰瞀癒。與上文所謂屬肝屬風。屬木之病相似。何爲皆屬於火。曰舌本強。曰痰涎有聲。何爲皆屬於上。痿論俱未嘗言及。而吾子合火土二家之病而又與倦怠並言。總作諸痿治之。其將有說以通之乎。

予應之曰。按原病式曰。風病多因熱甚。俗云風者。言末而忘其本也。所以中風而有癱瘓諸證者。非謂肝木之風實甚而卒中之也。亦非外於中風。良由將息失宜。腎水虛甚。則心火暴盛。水不制火也。火熱之氣怫鬱神明昏冒。筋骨不用。而卒倒無所知也。亦有因喜怒思悲恐。五志過極而卒中者。五志過熱甚故也。

又原病曰。脾之脉連舌本。散舌下。今脾臟受邪。故舌強。又河間曰。胃腑熱甚。火氣炎上。傳化失常。故津液湧而爲痰涎。潮上。因其稠黏難出。故作聲也。一以屬脾。一以爲胃熱。謂之屬火與土。不亦宜乎。雖然岐伯仲景孫思邈之言風。大意似指外邪之感。劉河間之言風。明指內傷熱證。實與痿論所言諸痿生於熱相合。外感之邪。有寒熱虛實。而挾寒者多。內傷之熱。皆是虛證。無寒可散。無實可瀉。局方本爲外感立方。而以內傷熱證。衰同論治。其爲害也。似非細故。

或曰。風分內外。痿病因熱。既得聞命矣。手陽明大腸經。肺之腑也。足陽明胃經。脾之腑也。治痿之法。取陽明一經。此引而未發之言。願明以告我。

予曰。諸痿生於肺熱。只此一句。便見治法大意。經曰。東方實。西方虛。瀉南方。補北方。此固是就生尅言補瀉。而大經大法。不外於此。東方木。肝也。西方金。肺也。南方火。心也。北方水。腎也。五行之中。惟火有二。腎雖有二。水居其一。陽常有餘。陰常不足。故經曰。一水不勝二火。理之必然。肺金體燥而居上。主氣。畏火者也。脾土性濕而居中。主四肢。畏木者也。火性炎上。若嗜慾無節。則水失所養。火寡於畏。而侮所勝。肺得火邪而熱矣。木性剛急。肺受熱。則金失所養。木寡於畏而侮所勝。脾得木邪而傷矣。肺熱則不能管攝一身。脾傷則四肢不能爲用。而諸痿之病作。瀉南方。則肺金清。而東方不實。何脾傷之有。補北方。則心火降。而西方不虛。何肺熱之有。故陽明實則宗筋潤。能束骨而利機關矣。治痿之法。無出於此。駱龍吉亦曰。風火既熾。當滋腎水。東垣先生取黃檗爲君。黃芪等補藥之輔佐。以治諸痿。而無一定之方。有兼痰積者。有濕多

者。有熱多者。有濕熱相半者。有挾氣者。臨病製方。其善於治痿者乎。雖然藥中肯綮矣。若將理失宜聖醫不治也。天產作陽厚味發熱。先哲格言。但是患痿之人。若不淡薄食味。吾知其必不能安全也。

或曰。小續命湯與要略相表裏。非外感之藥乎。地仙丹治勞傷腎虛。非內傷之藥乎。其將何以議之。

予曰。小續命湯比要略少當歸石膏。多附子防風防己。果與仲景意合否也。仲景謂汗出則止藥。局方則曰久服差。又曰久病風陰晦時更宜與。又曰治諸風。似皆非仲景意。然麻黃防己可久服乎。諸風可通治乎。地仙丹既曰補腎而滋補之藥。與僭燥走竄之藥相半用之。腎惡燥。而謂可以補腎乎。借曰足少陰經。非附子輩不能自達。八味丸仲景腎經藥也。八兩地黃以一兩附子佐之。觀此則是非可得而定矣。非吾之過論也。

又觀治氣一門。有曰治一切氣。冷氣。滯氣。逆氣。上氣。用安息香丸。丁沉丸。大沉香丸。蘇子丸。匀氣散。如神九。集香丸。白沉香丸。煨姜丸。鹽煎散。七氣湯。九痛。溫白丸。生姜湯。其治嘔吐膈噎也。用五膈丸。五膈寬中散。膈氣散。消癥丸。草豆蔻丸。撞氣丸。人參丁香散。其治吞酸也。用丁沉煎丸。小理中丸。其治痰飲也。用倍朮丸。消飲丸。溫中化痰丸。五套丸。且於各方條下。或曰口苦失味。曰噫酸。曰舌澁。曰吐清水。曰痞滿。曰氣急。曰脇下急痛。曰五心中熱。口爛生瘡。皆是明著熱證。何爲率用熱藥。夫周流於人之一身。以爲生者氣也。陽往則陰來。陰往則陽來。一升一降。無有窮已。苟內不傷於七情。外不感於六淫。其爲氣也。何病之有。今曰冷氣。滯氣。逆氣。上氣。皆是脏受火邪。氣得炎上之化。有升無降。薰蒸清道。甚而至於上焦不納。中焦

不化。下焦不滲。展轉傳變。爲嘔。爲吐。爲膈。爲噎。爲痰。爲飲。爲翻胃。爲吞酸。夫治寒以熱。治熱以寒。此正治之法也。治熱用熱。治寒用寒。此反佐之法也。詳味前方。既非正治。又非反佐。此愚之所以不能無疑也。謹按原病式曰。諸嘔吐酸。皆屬於熱。諸積飲痞膈中滿。皆屬於濕。諸氣逆衝上。嘔涌溢。食不下。皆屬於火。諸堅痞脹滿急痛。吐腥穢。皆屬於寒。深契仲景之意。金匱要略曰。胷痹病。胷背痛。括蔞薤白湯主之。胷痹心痛徹背。括蔞薤白半夏湯主之。心下痞氣結在胷脇下。上逆搶心者。枳實薤白括蔞桂枝湯主之。嘔而心下痞者。半夏瀉心湯主之。乾嘔而利者。黃芩加半夏生姜湯主之。諸嘔吐穀不得入者。小半夏湯主之。嘔吐病在膈上者。猪苓湯主之。胃反嘔吐者。半夏麥蘗湯主之。食已卽吐者。大黃甘草湯主之。胃反吐而渴者。茯苓澤瀉湯主之。吐後欲飲者。文蛤湯主之。病似嘔不嘔。似噦不噦。心中無柰者。姜汁半夏湯主之。乾嘔手足冷者。陳皮湯主之。噦逆者。陳皮竹茹湯主之。乾嘔下痢者。黃芩湯主之。氣衝上者。皂莢丸主之。上氣脉浮者。厚朴麻黃湯主之。上氣脉沉者。澤漆湯主之。大逆上氣者。麥門冬湯主之。心下有痰飲。胷脇支滿。目眩。茯苓桂枝湯主之。短氣有微飲。當從小便出之。宜茯苓桂朮甘草湯。腎氣丸亦主之。病者脉伏。其人欲自利。利者反快。雖利心下續堅滿者。此爲流飲欲去。故立甘遂半夏湯主之。病懸飲者。十棗湯主之。病溢飲者。當發其汗。宜大青龍湯。又宜用小青龍湯。心下有支飲。其人若冒眩。澤瀉湯主之。支飲胷滿者。厚朴大黃湯主之。支飲不得息。葶藶大棗瀉肺湯主之。嘔家本渴。今反不渴。心中有支飲故也。小半夏湯主之。卒嘔吐。心下痞膈間有水眩悸者。小半夏加茯苓湯主之。假令瘦人臍下有悸者。吐涎沫而頭眩。

水也。五苓散主之。心胷有停痰宿水。自吐水後。心胷間虛氣滿。不能食。消痰氣。令能食。茯苓飲主之。先渴後嘔。爲水停心下。此屬飲家。半夏加茯苓湯主之。觀其微意。可表者汗之。可下者利之。滯者導之。欝者揚之。熱者清之。寒者温之。偏寒偏熱者。反佐而行之。挾濕者淡以滲之。挾虛者補而養之。何嘗例用辛香燥熱之劑。以火濟之火。實實虛虛。咎將誰執。

或曰。脉訣謂熱則生風。冷生氣。寒主收引。今冷氣上衝矣。氣逆矣。氣滯矣。非冷而何。吾子引仲景之言而斥其非。然則諸氣諸飲。嘔吐反胃呑酸等病。將無寒證耶。

予曰。五臟各有火。五志激之。其火隨起。若諸寒爲病。必須身犯寒氣。口得寒物。乃爲病寒。非若諸火病自內作。所以氣之病寒者十無一二。

或曰。其餘痰氣嘔吐者。酸噎膈反胃作熱。作火論治。於理可通。若病人自言冷氣從下而上者。非冷而何。

予曰。上升之氣。自肝而出。中挾相火。自下而出。其熱爲甚。自覺其冷。非眞冷也。火極似水。積熱之甚。陽亢陰微。故見此證。冷生氣者。出高陽生之謬言也。若病果因感寒。當以去寒之劑治之。何至例用辛香燥熱爲方。不知權變。寧不慨人。

或曰。氣上升者。皆用黑錫丹。養正丹。養氣丹等藥。以爲鎮墜。然服之者。隨手得效。吾子以爲熱甚之病。亦將有慨耶。

予曰相火之外又有臟腑厥陽之火五志之動各有火起相火者此經所謂一水不勝二火之火出於天造厥陽者此經所謂一水不勝五火之火出於人欲氣之升也隨火炎上升而不降孰能禦之今人欲借丹劑之重墜而降之氣鬱爲濕痰丹性熱燥濕痰被劫亦爲暫開所以清快丹藥之法偏助狂火陰血愈耗其升愈甚俗人喜温迷而不返被此禍者滔滔皆是

或曰丹藥之墜欲降而升然則如之何則可

予曰投以辛涼行以辛温制伏肝邪治以鹹寒佐以甘温收以苦甘和以甘淡補養陰血陽自相附陰陽比和何升之有先哲格言其則不遠吾不贅及

或曰吐酸素問明以爲熱東垣又言爲寒何

予曰吐酸與吞酸不同吐酸是吐出酸水如醋平時津液隨上升之氣鬱積而成鬱積之久濕中生熱故從火化遂作酸味非熱而何其有積之於久不能自涌而出伏於肺胃之間咯不得上嚥不得下腠表得風寒則內熱愈鬱而酸味刺心腠表温暖腠理開發或得香熱湯丸津液得行亦得暫解非寒而何素問言熱者言其本也東垣言寒者言其末也但東垣不言外得風寒而作收氣立說欲瀉肺金之實又謂寒藥不可治酸而用安胃湯加減二陳湯俱犯丁香且無治熱濕鬱積之法爲未合經意予嘗治吞酸用黃連茱萸各製炒隨時令迭爲佐使蒼朮伏苓爲主病湯浸炊餅爲小丸吞之仍教以粗食蔬菜自養則病易安

或曰蘇合香丸雖是類聚香藥其治骨蒸殗熇月閉狐狸等病吾子以爲然乎

予曰古人製方用藥羣隊者必是攻補兼施彼此相制氣味相扶孰爲主病孰爲引經或用正治或用反佐各有意義今方中用藥一十五味除白朮朱砂訶子共六兩其餘一十二味共二十一兩皆是性急輕竄之劑往往用之於氣病與暴仆昏昧之人其衝突經絡漂蕩氣血若摧枯拉朽然不特此也至如草豆蔻散教人於夏月濃煎以代熱水夫草豆蔻性大熱去寒邪夏月有何寒氣而欲多服縮脾飲用草果亦是此意且夏食寒所以養陽也草豆蔻草果其食寒之意乎不特此也抑又有甚者焉接氣丹曰陽氣暴絕當是陰先虧陰先虧則陽氣無所依附遂致飛越而暴絕也上文乃曰陰氣獨盛陰氣若盛陽氣焉有暴絕之理假令陽氣暴絕宜以滋補之劑保養而鎮靜之庶乎其有合夏食寒以爲養陽之本何至又服辛香燥熱之劑乎且此丹下咽暴絕之陽果能接乎孰爲是否君其筭之

或曰局方言陰勝陰邪盛也陰邪既盛陽有暴絕之理子之所言與陽氣相對待之陰也果有陰虧而陽絕者吾子其能救之乎

予曰陰陽二字固以對待而言所指無定在或言寒熱或言血氣或言臟腑或言表裏或言動靜或言虛實或言清濁或言奇偶或言上下或言正邪或言生殺或言左右求其立言之意當是陰鬼之邪耳陰鬼爲邪自當作邪鬼治之若陰先虧而陽暴絕者嘗治一人矣浦江鄭兄年近六十奉養受用之人也仲夏久患滯下而又犯房勞忽一晚正走廁間兩手舒撒兩眼開而無光尿自出汗如雨喉如拽鋸呼吸甚微

其脉大而無倫次。無部位。可畏之甚。余適在彼。急令煎人參膏。且與灸氣海穴。艾炷如小指大。至十八壯。右手能動。又三壯。唇微動。參膏亦成。遂與一盞。至半夜後。盡三盞。眼能動。盡二斤。方能言而索粥。盡五斤而利止。十斤而安。

或曰。諸氣諸飲。與嘔吐吞酸。膈噎反胃等證。局方未中肯綮。我知之矣。然則要略之方。果足用乎。抑猶有未發者乎。

予曰。天地氣化無窮。人身之病亦變化無窮。仲景之書。載道者也。醫之良者。引例推類。可謂無窮之應用。借令略有加減脩合。終難踰越矩度。夫氣之初病也。其端甚微。或因些少飲食不謹。或外冒風雨。或內感七情。或食味過厚。偏助陽氣。積成膈熱。或賓主充實。表密無汗。或性急易怒。火炎上以致津液不行。清濁相干。氣爲之病。或痞或痛。不思食。或噫腐氣。或吞酸。或嘈雜。或膨滿。不求原本。便認爲寒。遽以辛香燥熱之劑。投之數貼。時暫得快。以爲神方。厚味仍前不節。七情反復。相仍舊病。被劫。暫開濁液。易於攢聚。或半月。或一月。前證復作。如此延蔓。自氣成積。自積成痰。此爲痰爲飲。爲吞酸之由也。良工未遇。繆藥又行。痰挾瘀血。遂成窠囊。此爲痞爲痛。嘔吐爲噎膈反胃之次第也。飲食湯液。滯泥不行。滲道壅澁。大便或祕。或溏。下失傳化。中焦愈停。醫者不察。猶執爲冷。翻思前藥。隨手得快。至此賓主皆恨藥欠燥熱。頗伺久服。可以溫脾壯胃。消積行氣。以冀一旦豁然之效。不思胃爲水穀之海。多血多氣。清和則能受。脾爲消化之氣。清和則能運。今反得香熱之偏助。氣血沸騰。其始也胃液凝聚。無所容受。其久也脾氣耗散。傳化漸遲。其

有胃熱易饑。急於得食。脾傷不磨。欝積成痛。醫者猶曰虛而積寒。非尋常草木可療。徑以烏附助佐丹劑。專意服餌。積而久也。血液俱耗。胃脘乾槁。其槁在上。近咽之下。水飲可行。食物難入。間或可入。亦不多。名之曰噎。其槁在下。與胃爲近。食雖可入。難盡入胃。良久復出。名之曰膈。亦曰反胃。大便祕少。若羊矢然。名雖不同。病出一體。要略論飲有六。曰痰飲、懸飲、溢飲、支飲、留飲、伏飲。分別五臟。諸證治法。至矣盡矣。第恨醫者不善處治。病者不守禁忌。遂使藥助病邪。展轉深痼。去生漸遠。深可哀憫。

或曰。千金諸方。治噎膈反胃。未嘗廢姜桂等劑。何吾子之多言也。

予曰。氣之欝滯。久留清道。非借香熱不足以行。然悉有大黃石膏竹茹芒硝澤瀉前胡朴硝茯苓黃芩蘆根括婁等藥爲之佐使。其始則同。其終則異。病邪易伏。其病自安。

或曰。胃脘乾槁者。古方果可治乎。將他有要捷之法者。或可補前人之未發者乎。

予曰。古方用人參以補肺。御米以解毒。竹瀝以消痰。乾薑以養血。粟米以實胃。蜜水以潤燥。姜以去穢。正是此意。張雞峯亦曰。噎當時神思間病。惟內觀自養。可以治之。此言深中病情。而施治之法。亦爲近理。夫噎病生於血乾。夫血陰氣也。陰主靜。內外兩靜。則臟腑之火不起。而金水二氣有養。陰血自生。腸胃津潤。傳化合宜。何噎之有。因觸類而長。曾製一方。治中年婦人。以四物湯加和白陳皮。留尖桃仁。生甘草。酒紅花。濃煎入驢尿飲。以防其或生蟲也。與數十貼而安。又台州治一匠者。年近三十。勤於工作。而有艾妻。且喜酒。其面白。其脈濇。重則大而無力。令其謝去工作。臥於牛家。取新温牛乳細飲之。每頓進一杯。一晝夜

可飲五七次。盡卻食物。以漸而至八九次。半月大便潤。月餘而安。然或口乾。蓋酒毒未解。間飲甘蔗汁少許。

或者又曰。古方之治噎膈反胃。未有不言寒者。子何不思之甚。

予曰。古人著方必爲當時抱病者設也。其人實因於寒。故用之而得效。後人遂錄以爲今式。不比局方泛編成書。使天下後世之人。凡有此證者。率遵守以爲之定法。而專以香熱爲用也。雖然。挾寒者。亦或有之。但今人之染此病。率因痰氣久得醫藥傳變而成。其爲無寒也明矣。

或曰。治脾腎以温補藥。豈非局方之良法耶。吾子其將何以議之。

予曰。衆言淆亂。必折諸聖。切恐脾腎有病。未必皆寒。觀其養脾丸。治脾胃虛冷。體倦不食。嘉禾散治脾胃不和。不能多食。消食丸治脾胃俱虛。飲食不下。小獨聖丸。治脾胃不和。不思飲食。大七香丸。治脾冷胃虛。不思飲食。連翹丸。治脾胃不和。飲食不下。分氣紫蘇飲。治脾胃不和。木香餅子。治脾胃虛寒。温中良姜丸。曰温脾胃。奪命抽刀散。曰脾胃冷。燒脾散曰脾胃虛。進食散曰脾胃虛冷。不思飲食。丁香煮散曰脾冷胃寒。二姜丸曰養脾温胃。姜合丸曰脾胃久虛。蓬煎丸曰脾胃虛弱。守金丸曰脾胃虛冷。集香丸曰脾胃不和。蟠葱散曰脾胃虛冷。壯脾丸曰脾胃虛弱。人參丁香散曰脾胃虛弱。人參煮散曰脾胃不和。丁沉透膈湯曰脾胃不和。丁香五奪丸曰脾胃虛弱。膃肭臍之壯氣暖腎。菟絲子丸之治腎虛。金鈆石斛丸之治氣不足。茴香丸之治臟虛冷。玉霜丸之治氣虛。安腎丸之治腎積寒。麝香鹿茸丸之益氣。養正丹之治諸

虛。朴附丸之治脾胃虛弱。接氣丹之治眞氣虛。四神丹之治五臟。沉香鹿茸丸之治氣不足。椒附丸之温五臟。蓯蓉大補丸之治元臟元氣虛。鍾乳白澤丸之治諸虛。三建湯之治氣不足。甚者類聚丹劑。悉曰補脾胃。温脾胃。補腎補五臟。補眞氣。而各方條下曰舌苦。曰面黃。曰舌苦無味。曰中酒吐酒。曰酒積。曰酒□。曰飲酒多。曰酒過傷。曰氣促喘急。曰口淡。曰舌澁。曰噫醋。曰舌乾。曰溺數。曰水道澁痛。曰小便出血。曰口苦。曰咽乾。曰氣促。曰盜汗。曰失精。曰津液內燥。曰氣上衝。曰外腎痒。曰枯槁失血。曰口脣乾燥。曰喘滿。曰肢體煩疼。曰衄血。曰小便淋瀝。悉是明具熱證。如何類聚燥熱。而謂可以健脾温胃。而滋腎補氣乎。經曰。熱傷脾。常服燥熱。寧不傷脾乎。又曰。腎惡燥。多服燥熱。寧不傷腎乎。又曰。熱傷元氣。久服燥熱。寧不傷氣乎。又曰用熱遠熱。又曰有熱者寒而行之。此教人用熱藥之法。蓋以熱藥治寒病。苟無寒藥爲之嚮導佐使。則病拒藥而扞格不入。謂之遠熱者。行之有寒也。兩句同一意。恐後人不識此理。故重言以明之。今局方辛香燥熱以類而聚之。未嘗見其所謂遠熱也。用熱而不遠熱。非惟不能中病。抑且正氣先傷。醫云乎哉。夫良醫之治病也。必先求其得病之因。其虛邪也。當治其母。實邪也。當治其子。微邪也。當治其所勝。賊邪也。當治其所不勝。正邪也。當治其本。經索矩。又謂雜合受邪病者。所受非止一端。又須察其有無雜合之邪。輕重。較量視標本之緩急。以爲施治之先後。今乃一切認爲寒冷。吾不知脾胃與腎。向只是寒冷爲病耶。諺方至此。雖至愚昧。不能不致疑也。吾又攷之要略矣。諸嘔吐穀不得入者。小半夏湯主之。痰病寒熱不食。食則頭眩。心胷不安者。茵蔯湯主之。身腫而冷。胷窒不能食。病在骨節。發汗則安。心胷停痰吐

水虛滿不能食者伏苓湯主之中風手足拘急惡寒不欲飲食者三黃湯主之下利不欲飲食者大承氣湯主之五勞虛極羸瘦不能食者大黃䗪虫丸主之虛勞不足汗出而悶脈結心悸者炙甘草湯主之虛勞腰痛小腹拘急者八味丸主之虛勞不足者大薯蕷丸主之虛勞虛煩不得眠者酸棗仁湯主之夫嘔者胃滿者吐水者下利者惡寒者腫而冷者不能飲食者虛勞羸瘦者虛勞汗而悸者虛勞而腰痛者虛勞不足者虛勞煩而不眠者自局方之法觀之寧不認爲寒冷而以熱藥行之乎仲景施治則不然也痰者導之熱者清之積者化之濕者滲之中氣清和自然安裕虛者補之血凝者散之躁者寧之熱者和之陰氣清寧何虛勞之有也

或曰傷寒一門雖取雜方仲景之法亦摘取之矣吾子其忘言乎

予曰傷寒之法仲景而下發明殆盡局方是否愚不必贅雖然仲景論傷寒矣而未及乎中寒先哲治冒大寒而昏中者用附子理中湯而安其議藥則得之矣曰傷曰中未聞有議其意同之者予俛而思之傷寒有即病有不即病必大發熱病邪循經而入以漸而深中寒則倉卒感受其病即發而暴傷寒之人因其舊有鬱熱風寒外束肌腠自密鬱發爲熱其初也用麻黃桂枝輩微表而安以病體不甚虛也中寒之人乘其腠理疎豁一身受邪難分經絡無熱可發温補自解此謂氣之大虛也傷寒熱雖甚不死中寒若不急治去生甚遠其虛實蓋可見矣

或曰脾胃一門子以局方用藥太熱未合經意若平胃散之温和可以補養胃氣吾子以爲何如

予曰。蒼朮性燥氣烈。行溫解表。甚爲有力。厚朴性溫散氣。非脹滿實急者不用。承氣用之可見矣。雖有陳皮甘草之甘緩甘辛。亦是決裂耗散之劑。實無補土之品。經謂土氣大過曰敦阜。亦能爲病。況胃爲水穀之海。多氣多血。故因其病也。用之以瀉有餘之氣。使之平爾。又雖察其挾寒得寒物者投之。胃氣和平。便須卻藥。謂之平者。非補之之謂。其可常服乎。

或曰。調胃承氣。亦治胃病。謂之調者。似與平胃散之平意義相近。何用藥之相遠也。

予曰。調胃承氣治熱中下二焦藥也。經曰。熱淫於內。治以鹹寒。佐以苦甘。功在乎導利。而行之以緩。平胃散止治濕上焦之藥也。經曰。濕上甚而熱。治以苦濕。佐以甘辛。以汗爲效而止。

或曰。治濕不利小便。非治也。非仲景法耶。何予言之悖也。

予曰。淡滲治濕。以其濕在中下二焦。今濕在上。宜以微汗而解。不欲汗多。故不用麻黃乾葛輩。

或曰。局方用藥多是溫補。或以爲未合中道。積熱痼冷二門。其制作。其取用。吾子其無以議之矣。

予曰。張仲景言一百八病。五勞六極七傷。與婦人共三十六病。孫眞人言四百四病。凡遇一病。須分寒熱。果寒耶則熱之。果熱耶則寒之。寒熱甚耶則反佐而制之。今列病之目。僅十有餘。而分積熱痼冷兩門。何不思之甚也。要略中風脈緊爲寒。浮爲虛。肺痿吐涎。不能欬不渴。必遺溺。此爲肺中冷。甘草乾姜湯溫之。腹滿痛。時減如故。此爲寒。宜溫之。下利欲嘿不能。此腹中寒也。脇下偏痛。脈弦緊。此寒也。宜大黃附子細辛湯溫之。痰飲脈雙弦者寒也。黃疸發熱。煩喘胃滿口燥。又被火劫其汗。病從濕得。身盡熱而黃。此熱在

內宜下之。下利脉數而渴。設不差。則淸膿血。以其有熱也。婦人能食。病七八日而更發熱者。此爲胃實氣熱。宜大承氣下之。產後七八日。若太陽證。小便堅滿。此惡露不盡。不大便四五日。發熱。哺時煩燥。食則妄言。此熱在裏。結在膀胱。宜大承氣利之。安婦人或中風。或傷寒。經水適來。適斷。有寒熱者。爲熱入血室。今局方不曾言病。而所謂寒與熱者。其因何在。其病何名。果然雜合所受邪。果無時令資稟之當擇耶。據外證之寒熱而遂用之。果無認假爲眞耶。果以是爲非也。

或曰。以寒熱爲篇目。固未合經意。若其諸方果有合乎。

予曰。有積熱爲篇目。固有可議。若諸方之制作。取用儘有妙理。吾其爲子發明前人之意。恐可爲用者消埃之助。夫紫雪者。心脾肝腎胃經之藥也。通中散。洗心散。表裏血氣之藥也。涼膈散。心肺脾胃之藥也。龍腦飮子。勝冰丹。眞珠散。靈液丹。上中二焦之藥也。碧雷雞蘇丸。三黃丸。八正散。三焦藥也。甘露丸。心脾肝之藥也。涼膈丸。心脾胃之藥也。抱龍丸。麥門冬散。心肺肝之藥也。妙香丸。疏快腸胃。制伏木火藥也。甘露飮。心肺胃藥也。五淋散。血而裏藥也。消毒飮。氣而表藥也。麻仁丸。氣而裏藥也。導赤丸。氣與血而裏藥也。導赤散。心小腸藥也。有升有降。有散有補。有滲導。有驅逐。有因用。有引經。或緩之以甘。或收之以酸。或行之以香。或因之以蠟。或燥之以苦。觀其立方各有所主。用方之人。宜求其意。若夫痼冷門。尤有可議者。冷卽寒也。內經以寒爲殺厲之氣。今加痼於冷之上。豈非指身惡寒而口喜熱之病耶。若以此外證便認爲痼冷。宜乎夏英公之常餌烏附。常御綿帳。不知濕痰積中。抑遏陽氣。不得外泄。身必惡寒。經曰。亢則害。承

乃制。又劉河間曰。火極似水。故見此證。當治以鹹寒。佐以甘溫。視標之先後。正邪之虛實。孰緩孰急。爲之正法。何至類用烏附丹劑。僭燥之藥。抱薪救火。屠劊何異。古人治戰慄。有以大承氣湯下之而愈者。惡寒戰慄。明是熱證。亦是因久服熱藥而得之者。但有虛實之分耳。進士周本道。年近四十。得惡寒證。服附子數日而病甚。求余治。診其脉。弦而似緩。遂以江茶入薑汁香油些少。吐痰一升許。減綿大半。又與通聖散去麻黃大黃芒硝加當歸地黃百餘貼而安。又一色目婦人。年近六十。六月內常覺惡寒戰慄。喜啖熱御綿。多汗如雨。其形肥膸厚。已得附子二十餘。但渾身痒甚。兩手脉沉濇重取稍大。知其熱甚而血虛也。以四物湯去川芎。倍地黃。加白朮黃芪。炒棘生甘草。人參。每貼二兩重。方與一貼。腹大泄。目無視。口無言。予知其病熱深而藥無反佐之過也。仍取前藥熟炒與之。蓋借火力爲嚮導。一貼利止。四貼精神回。十貼病全安。又蔣氏婦年五十餘。形瘦面黑。六月喜熱惡寒。兩手脉沉而濇。重取似數。以三黃丸下以姜汁。每三十粒。三十貼。微汗而安。彼以積熱痼冷爲敍方之篇目。其得失可知矣。

泄痢一門。其用鍾乳健脾丸。朝眞丸。駐車丸。呵梨勒丸。大溫脾丸。黃連阿膠丸。胡粉丸。桃花丸。訶梨勒散。木香散。七棗湯。赤石脂散。養臟湯。御米湯。金粟湯。狗頭骨丸。豆蔻丸。肉豆蔻散。三神丸。丁香豆蔻散。止瀉丸。皆用熱藥爲主治。以澁藥爲佐使。當爲腸虛感寒而成滑痢者設也。彼瀉痢者。將無熱證耶。將無積滯耶。內經曰。春傷於風。夏爲膿血。多屬滯下。夫瀉痢證。其類尤多。先賢曰。濕多成瀉。此確論也。曰風。曰濕。固不可得而通治矣。況風與濕之外。又有雜合受邪。似難例用澁熱之劑。今方中書證。有兼治裏急者。有兼

治後重者。有兼治裏急後重者。此豈非滯下之病乎。今瀉利與滯下袞同論治。實實虛虛之患。將不俟終日矣。

或曰。然則瀉痢與滯下。爲病不同。治法亦別。吾子其能通之乎。

予曰。經曰。暴注下迫。皆屬於熱。又曰。暴注屬於火。又下痢清白屬於寒。熱君火之氣。火相火之氣。寒寒水之氣。屬火熱者二。屬水寒者一。瀉痢一證。似乎屬熱者多。屬寒者少。詳玩局方專以熱澁爲用。若用之於下痢清白而屬於寒者。斯可矣。經所謂下迫者。卽裏急後重之謂也。其病屬火相火所爲。其毒甚於熱也。投以澁熱。非殺之而何。謹按仲景之法。謂下痢脉滑而數者有宿食。當下之。下痢脉遲而滑者實也。痢爲未止。急下之。下痢脉反滑。當有所去。下之安。下痢不欲食。有宿食者。當下之。痢腹滿痛。爲寒爲實。當下之。下痢腹堅實。當下之。下痢譫語有燥矢。當下之。下痢二部皆平。按之心下堅。急下之。下痢已差。至其時復發者。此爲下未盡。更下之安。下痢脉大浮弦。下之當自愈。風寒下者不可下。下後心下堅痛。脉遲。此爲寒。宜温之。脉浮大。此爲虛。強下之故也。設脉浮革者。因而腸鳴。當温之。下痢脉遲緊痛。未欲止。當温之。下痢心痛。急當救裏。可與理中四逆附子輩。下痢大孔痛。宜温之。觀仲景可下者十法。可温者五法。謂之下者。率用承氣加減。何嘗以砒丹巴硇決烈燥熱重毒之劑。謂之温者。率用姜附爲主。何嘗用鍾乳龍骨石脂粟殼緊澁燥毒之劑。

或曰。可下者。豈非腸胃有積滯乎。不用砒丹巴硇。恐積滯未易行也。吾子以爲未然。幸發明承氣之意。

可乎。

予曰。大黃之寒。其性善走。佐以厚朴之温。善行滯氣。緩以甘草之甘。飲以湯液。灌滌腸胃。滋潤輕快。無所留滯。積行卽止。砒丹巴硇。毒熱類聚。劑成丸藥。其氣凶暴。其體重滯。積垢雖行。毒氣未過。譬如強暴貪賊。手持兵刃。其可使之徘徊顧瞻於堂奧間乎。借使有愈病之功。其腸胃清淳之氣。能免旁損暗傷之患乎。仲景治痢。可温者温。可下者下。或解表。或利小便。或待其自已。區別易治難治。不治之證。至爲詳密。然猶與滯下衰同立方命論。其後劉河間分別在表在裏。挾風挾濕。挾熱挾寒。挾虛。明著經絡。隄防傳變。大概發明滯下證治。尤爲切要。和血則便濃自愈。調氣則後重自除。此實盲者之日月。聾者之雷霆也。

或曰。局方治法。將終不能彷彿仲景之方耶。

予曰。圓機活法。內經具舉。與經意合者。仲景之書也。仲景因病以製方。局方製藥以俟病。若之何其能彷彿也。宋命近臣讎校方書。彼近臣者。術業素異。居養不同。焉知爲醫之事哉。雖然知尊仲景矣。亦未嘗不欲效之也。徒以捧心效西施。矉。觀桃花丸一方可見矣。卽要略桃花湯也。仲景以治便膿血。用赤石脂完者。乾薑粳米同煮。作湯一飲。病安便止。後藥意謂病屬下焦。血虛且寒。非乾薑之温。石脂之澁。且重不能止血。粳米味甘。引入腸胃。不使重澁之體。少有凝滯。故煮成湯液。藥行易散。餘毒亦無。局方不知深意。不造妙理。但取易於應用。喜其性味温補。借爲止瀉良方。改爲丸藥。劑以麵糊。日與三服。其果能與仲景之意合也。

或曰。河間之言滯下。似無挾虛挾寒者。然乎否乎。幸明以告我。

予曰。泄痢之病。水穀或化或不化。並無努責。惟覺困倦。若滯下則不然。或膿或血。或膿血相雜。或腸垢或無糟粕。或糟粕相混。雖有痛不痛大痛之異。然皆裏急後重。逼迫惱人。攷之於經。察之於證。似乎皆熱證。實證也。余近年涉歷。亦有大虛大寒者。不可不知。敢筆其略。以備采覽。余從叔年踰五十。夏間患滯下。病腹微痛。所下褐色。後重頻併。穀食大減。時有微熱。察其脉皆弦而濇。似數而稍長。卻喜不甚浮大。兩手相等。視其神氣大減。余曰。此非滯下。憂慮所致。心血虧。脾氣弱耳。遂與參朮爲君。當歸身陳皮爲臣。川芎炒白芍藥茯苓爲佐使。時暄熱甚。加少黃連。與兩日而安。梅長官年三十餘。奉養厚者。夏秋間患滯下。腹大痛。有人教服單煮乾薑。與一貼痛定。少頃又作。又與又定。由是服乾姜至三斤。八日後。予視之。左脉弦而稍大似數。右脉弦而稍大減。亦似數。重取之似緊。余曰。此必醉飽後喫寒冷太過。當作虛寒治之。因其多服乾姜。遂教四物湯去地黃。加人參白朮陳皮。酒紅花。茯苓。炒仁。煎入生姜汁飲之。至一月而安。金氏婦年近四十。秋初尚熱。患滯下。腹但隱痛。夜重於晝。全不得睡。食亦稍減。口乾不飲。已得治痢靈砂二貼矣。余視之。兩手脉皆濇。且不勻。神思倦甚。飲食全減。因與四物湯倍加白朮爲君。以陳皮佐之。與十數貼而安。此三病者。若因其逼迫而用峻劑。豈不慄人。

或曰。局方諸湯。可以清痰。可以消積。可以快氣。可以化食。口鼻既宜。胃腦亦紓。平居無事。思患預防。非方之良者乎。

予曰。清香美味。誠足快意。揆之造化。恐未必然。經曰。陰平陽祕。精神乃治。氣爲陽宜降。血爲陰宜升。一升一降。無有偏勝。是謂平人。今觀諸湯。非豆蔻縮砂乾姜良姜之辛。宜於口。非丁香沉檀蘇桂之香。宜於鼻。和以酸醎甘淡。其將何以悅人。奉養之家。閑佚之際。主者以此爲禮。賓朋以此取快。不思香辛升氣。漸至於散。積温成熱。漸至鬱火。甘味戀膈。漸成中滿。脾主中州。本經自病。傳化失職。清濁不分。陽亢於上。陰微於下。謂之陰平可乎。謂之陽祕可乎。將求無病適足生病。將求取樂。反成受苦。經曰。久而增氣。物化之常。氣增而久。天之由也。其病可勝言哉。

或曰。舍利別非諸湯之類乎。其香辛甘酸。殆有甚焉。何言論弗之及也。

予曰。謂之舍利別者。皆取時果之液。煎熬如餳。而飲之稠之。甚者調以沸湯。南人因名之曰煎。味雖甘美。性非中和。且如金櫻煎之縮小便。杏煎楊梅煎蒲桃煎櫻桃煎之發冒火。積而至久。濕熱之禍。有不可勝言者。僅有桑椹煎無毒可以解渴。其餘味之美者。並是嬉笑作罪。然乎否乎。

或曰。婦人一門。無非經候胎產帶下。用藥温暖。於理頗通。吾子其無忘言乎。

予曰。婦人以血爲主。血屬陰。易於虧欠。非善調攝者。不能保全也。餘方是否。姑用置之。若神仙聚寶丹。則有不能忘言者。其方治血海虛寒。虛熱盜汗。理宜補養。琥珀之燥。麝香之散。可以用乎。面色痿黃。肢體浮腫。理宜導濕。乳香沒藥固可治血。可以用乎。胎前產後。虛實不同。逐敗養新。攻補難並。積塊堅癥。赤白崩漏。宜於彼者。必妨於此。而欲以一方通治乎。世人以其貴細温平。又喜其常服。可以安神去邪。令人有子。

殊不知積溫成熱。香竄散氣。服者無不被禍。自非五臟能言。醫者終不知覺。及至變生他病。何曾歸咎此丹。余姪女形色俱實。以得子之遲。服此藥。背上發癰。證候甚危。余診其脈。散大而濇。急以加減四物湯百餘貼。補其陰血。幸其質厚。易於收救。質之薄者。悔將何及。若五積散之治產後餘血作痛。則又有不能忘言者。以蒼朮爲君。麻黃爲臣。厚朴枳殼爲佐。雖有芎藥當歸之補血。僅及蒼朮三分之一。且其方中言婦人血氣不調。心腹攪痛。閉而不行。並宜服之。何不思產後之婦。有何寒邪。血氣未充。似難發汗。借曰推陳致新。藥性溫和。豈可借用麻黃之散。附以蒼朮枳。麻虛而又虛。禍不旋踵。率爾用藥。不思之甚。

或曰。初產之婦。好血已虧。瘀血尚留。黑神散非要藥歟。

予曰。至哉坤元。萬物資生。理之常也。初產之婦。好血未必虧。汚血未必積。臟腑未必寒。何以藥爲。飲食起居。勤加調護。何病之有。誠有汚血體怯而寒。與之數貼。亦有簡便。或有他病。當求病起何因。病在何經。氣病治氣。血病治血。寒者溫之。熱者清之。疑者行之。虛者補之。血多者止之。何用海製此方。不恤無病生病。彼黑神散者。用乾姜當歸之溫熱。黑豆之甘。熟地黃之微寒。以補血之虛。佐以炒蒲黃之甘。以防出血之多。芎藥之酸寒。有收有散。以爲四藥之助。官桂之大辛熱。以行滯氣。推凝血。和以甘草之緩。其爲取用。似乎精密。然驅逐與補益。似難同方施治。設有性急者。形瘦者。本有怒火者。夏月坐蓐者。時有火令。姜桂皆爲禁藥。論語未達之戒。不知誰執其咎。至於將護之法。尤爲悖理。肉汁發陰經之火。易成內傷之病。先哲具有訓戒。胡爲以羊雞濃汁作糜。而又常服當歸丸。當歸建中湯。四順理中丸。雖是滋補。悉犯桂附乾姜。

僭熱之劑。臟腑無寒何處消受。若夫兒之初生。母腹頓寬。便啖雞子。且喫火鹽。不思雞子難化。火鹽發熱。展轉爲病。醫者不識。每指他證。率爾用藥。寧不悞人。余每見產婦之無疾者。必教以卻去黑神散。與夫雞子火鹽諸般肉食。且與白粥將理。間以些少石首簽煮令甘淡食之。至半月以後。方與少肉。若雞子亦須豁開淡煮。大能養胃卻疾。彼富貴之家驕恣之婦。卒有白帶頭風氣痛膈滿痰逆口乾經水不調髮脫體熱。皆是陽勝陰虛之病。天生血氣。本自和平。曰勝曰虛。又因知非此等繆妄。有以啓之耶。

雜類名方

撰人不詳

本館據濟生拔萃
本影印初編各叢
書僅有此本

雜類名方藥目錄　濟生拔粹卷第十九

麒麟竭散　虎骨丸
如聖散　清膈湯
增損防風通聖散　防己黃耆湯
交解飲子　木香分氣丸
藿香安胃散　流氣飲子
大枳殼丸　木香檳榔丸
奪命丹　接骨丹
神聖膏　紅鉛散 斑
固真丹　嗑藥
蒼金砂散 丁瘡　蟾光膏 目疾
揩牙藥　破傷方

益智湯
勻氣散
三和丸
蟇應膏
刀剪藥
三脫痞氣丸
治大疥方
桃紅散
頰下核不消方
發散瘡腫方
赴筵散
咽痛方
取丁瘡藥經効
復堅散瘡
神應散牙疼
通頂散
金砂流溫丸
二十八宿散
治疥癬
烏金散
治甜瘡
五渾散
玉壺散癭
如聖散吹牙

治風狗傷　藥蛆方
治臁瘡　祛風至寶丹
起死神應丹　諸惡瘡方
治破傷風將死　獨聖散
常山散瘧　三和湯
浴齊癬方　治血疝
沉香導重丸蠱　神人阿魏散勞
救苦黃耆散　受拜平胃散
獨活散　導水丸下劑
治大頭喉痺散　當歸散血崩
蓮殼散　治喉痺方
防風通聖散　萬應針頭丸

貼瘡丹　桃仁煎丸諸積

雜類名方藥目録　濟生拔粹卷第十九

麒麟竭散 治寒濕滯於經絡疼痛不可忍

血竭 南乳香 沒藥 白芍藥 當歸各陸分
水蛭炒令烟盡 麝香各叁分 虎脛骨酥炙黃五分

右八味為細末和勻每服二錢溫酒調下食前

虎骨丸 治經絡凝澁骨節疼痛筋脉攣急遇陰寒愈痛

南乳香另研 沒藥另研 赤芍藥 熟地黃 虎脛骨酥炙黃
當歸各壹兩 血竭五分

右為末用木瓜一枚切破去子入乳香末在內以麻纏縛定勿令透氣好酒一升煮至酒盡取木瓜去皮研如泥更入熟蜜少許杵和為丸如桐子大每服五十丸病在上食後在下食前溫酒下

如聖散 治時氣纏喉風漸入咽塞水穀不下牙關緊急不省人事

雄黃細研 白礬飛 藜蘆去皮用心生用 猪牙皂角去皮炙

右等分爲細末每用一豆許吹鼻內立效

清膈湯 治風熱化痰利咽膈清頭目消瘡疹

甘草炒 芥蓼根 桔梗炒 紫蘇葉各貳兩

雞蘇葉壹兩半 荆芥穗四兩 黍粘子陸兩炒淨

右爲細末每服一二錢食後臨睡白湯點服

獨損防風通聖散 治鼻塞不利肺氣不和

黍粘子 桔梗 桑白皮 紫菀昔已上各半兩

荆芥穗四兩 甘草貳兩已上各生用

右爲麤末防風通聖散各一半和勻每服八錢水一盞半入生姜五片同煎去滓溫服食後

防己黃耆湯治風濕相搏客在皮膚一身盡重四肢少力關節煩疼自汗洒淅惡風不欲去衣及風水客搏腰脚浮腫上輕下重不能屈伸

防己四兩　黃耆五兩　甘草貳兩炙　白朮叁兩

右為麤末每服三錢水一盞半生姜三片棗一枚同煎至一盞去滓稍熱服不計時候蓋覆溫卧汗出差

又解飲子治虛疾辟瘴氣神効

肉豆蔻　草豆蔻各二个一个用水和白麪裹煨一个生用

厚朴二寸半生姜汁塗炙一半生用　甘草大者二寸一半炙一半生用

生姜一塊如棗大一塊用濕紙裹煨熟一塊生用

右各咬咀同匀每服分一半用水一椀煎至一大盞去滓溫服空心

木香分氣丸 善治脾胃不和心腹脹滿兩脇膨脹胸膈注悶痰嗽喘息醋心乾嘔咽喉不利飲食不化並皆治之大有効

木香 檳榔 青皮去白 陳皮去白 荆三稜 温煨香 姜黄 玄胡 蓬莪茂炮 乾生姜 當歸 白朮 赤茯苓去皮 肉豆蔻 枳殼麩炒 秋冬加丁香妙

右為細末用白麵糊為丸小豆大每服三五十丸生姜湯下忌生葱馬齒

藿香安胃散 治嘔吐不止

藿香葉壹兩 半夏貳兩洗 陳皮貳兩去白 厚朴壹兩姜製 蒼朮叁兩泔浸 甘草貳兩炙

右為麤末每服五錢水一盞半生姜五片棗二枚同煎七分温服

流氣飲子治男子婦人五藏不調二焦氣壅心胸痞滿噎塞不通膜脇膨脹嘔吐不食又治上氣喘急咳嗽涎盛面目虛浮四肢腫痛大便秘澁小便不通又治憂思太過致陰陽之氣鬱結不散壅滯成痰又治傷寒纔覺得疾服此升降陰陽汗出立愈又治腳氣腫滿疼痛喘急腹脹氣攻肩背脇肋走注疼痛並皆治之

紫蘇葉 青皮去白 當歸洗 芍藥 烏藥
茯苓 桔梗 半夏洗 甘草炙 川芎
黃耆 枳實麩炒 防風已上各半兩 陳皮去白七分半
木香貳分半 檳榔 枳殼麩炒 大腹子劈 生薑汁浸一宿焙各伍分

右㕮咀每服秤半兩水一盞半生薑三片棗一枚同煎去滓熱服

如心脾病入菖蒲五片同煎
如婦人血氣病入艾同煎
如傷寒頭痛發熱咳嗽入連鬚蔥白二寸同煎
如五膈氣病入陳皮少許同煎
如心中怔忪入麥門冬數粒同煎
如藏府利入粳米一撮同煎並不拘時候或鹿攪飣亦可

大枳殼丸 治一切酒食所傷胃膈痞悶脇肋脹滿心腹疼痛飲食不消痰逆嘔吐噫醋吞酸飲食遲化並宜服之

枳殼麩炒 茯苓去皮 白朮 厚朴姜製 半夏湯洗
人參 木香 青皮 陳皮二味去穰 京三稜煨熟
檳榔 廣茂煨熟 神麴炒黃 麥蘗微炒已上各壹兩
乾生姜半兩 牽牛淨微炒 大黃各貳兩

右爲細末生姜汁面糊爲丸桐子大每服一百丸生姜湯下食後

木香檳榔丸 治食傷大腸

木香　檳榔　青皮　陳皮　廣茂燒　黃連　枳殼麩炒去瓤各壹兩　黃蘗　大黃各叁兩　香附子炒　牽牛各四兩　婦人加當歸壹兩

右爲細末水丸如桐子大每服三十丸食後生姜湯下

奪命丹 治丁瘡發惡心及諸惡瘡

蟾酥半分　朱砂叁分水飛　輕粉半分　枯白礬壹分　寒水石壹分水飛　銅綠壹分　麝香壹字　海羊二十个另研即蝸牛也

右件爲細末將海羊另研爲泥就藥一處丸如綠豆大如丸不就加好酒成之病輕者一丸二丸重者二丸未効再服服

藥法先嚼生葱白一大口極爛置手心放藥丸于葱內裹合以熟酒送下暖處卧汗出為効忌冰水

接骨丹

金　半兩錢一文　燒紅醋蘸淬如无古老錢代

木　當歸　霍香葉　各壹分

水　水蛭　壹分同糯米炒紫色為度　血竭　壹分

火　虎骨　壹分酥炙　綿　貳分燒灰　血餘　貳个微炒焦。即兒孩兒胎頭也

土　乳香　麝香　沒藥　各壹分

右為細末另裹若損折甚者每服二錢輕者每服一錢半如有損折者除蛭錢服藥時令病人先飲好酒二五盞服後更飲二三盞次用紙裹以繩穿板子縛之

神聖膏　治瘰癧一切惡瘡

當歸半兩　杏仁四十九个　歷青壹兩　木鼈子五个去殼
黃丹叁兩　乳香四分另研　麝香　鷹調　輕粉已上二味不以多少
桃柳枝各長叁寸各計四十九枝

右用小油半斤以綿裹當歸杏仁木鼈子桃柳枝於沙石器內文武火熬却用一枝龍槐稍縛短嫩枝攪之候焦取出不用乃離火下黃丹歷青攪勻再上火少時滴水中不散為度勿令傷火軟了硬了俱不中後入乳香麝香輕粉鷹調畢傾在水盆內凝滯

紅鈴散　治走馬牙疳

綠礬不以多少

相礬色鮮明者入甘鍋用炭火燒鍋赤傾出以好酒洒拌勻再入鍋如此數遍色紅研作細末入麝香少許先以溫漿水

嚥淨用指蘸藥有疳處貼之

固真丹

沉香　丁香　木香　茴香炒　人參

當歸微炒　滑石各半兩　乳香另研五分　沒藥另研五分　乾胭脂另研一半爲衣

琥珀另研五分　川山甲蛤粉炒五分　全蝎微炒五分　代赭石水飛五分

乾蓮心微炒弍分半　木通頭末五分　灯草叁分　桑螵蛸炒或酥炙弍半

麝香另研弍半　血竭另研五分已上同川山甲搗　臘肉臍一對酒浸酥炙

蛤蚧乙對去頭足酥炙　火杪草酒蜜洒九蒸九曝　晚蚕蛾

青蜓各五分

右爲細末於辰火日合醋浸餬餅爲丸如櫻桃大每服二三丸温酒送下空心忌猪羊血蒜鯽馬服訖乾物壓之

呪曰三祝然後合之　北海泠泠雪浪如銀三江四海尽入

藥中能實骨髓能養精神誅殺鬼魅永保遐齡急急如律令奉勅攝

治偏頭疫眼疾

蒼耳道人頭　薄荷葉　盞硝　石膏各壹分乱文者水飛　乳香　華細辛　貫芎各半分

右爲極細末晨午夕三時嗑之

蒼金砂散　取丁瘡

道人頭微炒存性壹兩　硇砂半兩　雄黄叁分　加蟾酥不以多少杰妙

右將瘡四圍刺破以小油調藥末置於瘡内綵帛封之數日丁自出如瘡入膜嘔逆者煎道人頭濃汁飲之

蘇合香丸　治遠年病目不通道路退去雲膜須用臘月成開日合

白砂蜜四兩色白者妙用隔年葱一根去須皮切碎与蜜一同熬去白膜覰葱軟熟為度以綿攄滓放定用

希取爛面　黃丹 叁分水飛生用　蜜陀僧 叁分水飛生用

盧甘石 火煅過秤○已上叁味煞研極細重羅貯末傾入五分水飛　前蜜中挑柳无節病者各一枝攪勻

當歸　赤芍藥　杏仁 湯去皮尖已上三味各五分　黃連 去芦頭并英烘秤弍兩

川芎半兩　秦皮　阿子皮　防風　石膏

玄精石 龜背文者妙　井泉石　無名異　玄參

代赭石　石決明 已上十味各叁分咬咀用雪水或長流河水五升於銀器內煞至弍升攞去滓

單再煞至壹升將一十五味煞至壹升藥水內才傾入放下的藥蜜一同銀器內慢火煞藥紫金色時再添入後藥勿令過火　乳香　沒藥　琥珀　朱砂 另飛

薏仁 帶皮秤三分去皮用仁

已上五味各三錢前四味先乾研爛後入薏仁水飛一同研細折澄有滓再水飛澄清再水飛才傾入前紫金色藥內一同復煞一二沸以筋點藥滴於水中不散為度大抵勿令過

與不及取下於土中埋七日取出置於銀器盒中或磁器中如法收貯便再添入後細藥傾入藥時亦用挑柳枝攪勻

南鵬砂　珍珠　龍腦　珊瑚枝已上四味各壹分　麝香半分

右件五味終研極細亦以挑柳枝攪勻傾入前藥中復攪勻然後以紙封器盒口旋旋取用元盛藥器盒中如有取不盡藥用淨水斟酌洗渲却將渲藥水熬二五沸另行收拾或洗點眼或膏子藥稠了時傾入些小調解　右用桑柴燒　計二十九味

治牛藥

細辛　香白芷　滑石　縮砂仁　川芎已上各叁分　金絲礬五分　膽礬六分　麝香半分已上品茶壹兩半

右為細末臨卧揉之
治破傷見血酒一椀煎服
半兩當歸蠟二錢
真須軟爛連根喫

合來搥碎酒同煎
一切傷瘡保萬全

益智湯

乾生姜四兩 杏仁壹斤炒 白麵叁斤炒 甘草炒七兩 鹽三兩炒
益智仁叁兩 京三稜壹兩 青皮 陳皮各貳兩 蓬莪茂壹兩

右為極細末白湯點服

取丁瘡藥 金効

雄黃 礬砂各壹兩 蟾酥 金脚信各半分

右為細末刺破紐之 加輕粉半分 巴豆壹十个生用

白氣散 治氣疼痛脹噎嘔吐等證

丁香壹兩　藿香葉四兩　甘草四兩　木香　白豆蔻仁壹兩
縮砂仁貳兩　檀香壹兩
右爲極細末入塩少許沸湯點服無時

羌活散　治瘡

大陽本經　獨活半分　羌活壹分　防風半分　蔓本壹分半
調經中血氣　黄芩　生地黄　知母各壹分
黄連　黄蘗各壹分半已上五味皆酒洗
散瘡結聚　防風稍半分　當歸身　連翹各叁分
益元氣瀉火於三焦　黄耆壹分半　人參半分
甘草壹分炙　生甘草稍半分　瀉腎間火補下焦元氣
補胃　橘皮半分
除膀胱留熱　漢防已半分酒洗　澤瀉七分助秋去酒中濕熱

舟楫　桔梗壹分

右㕮咀作二服水二盞浸半日煎至一盞去滓稍熱服將二服滓更作一服服藥後不得飲冷水恐再作膿

三和丸 治三焦不和氣不升降心胸痞悶脇肋刺痛

枳實麩炒　檳榔　半夏湯洗各二兩　木香　青皮去白
陳皮去穰丁皮　赤茯苓去皮　蘿蔔子　白术各壹兩半
廣茂叁兩　沉香　桂去麁皮　藿香葉　白豆蔻仁各壹兩
黑牽牛壹斤微炒取頭末半斤　京三稜四兩

右為細末酒糊為丸桐子大每服三五十丸生姜湯下

神應散 揉治牙疼

川芎　防風　升麻　細辛　茯苓
白芷　香附子　蓽撥　甘松各等分　石膏比已上加三倍

右用水五升慢火煮乾搗作餅子曝乾再焙搗為極細末每服二錢入鹽少許點服　如泄瀉每服三錢姜五片烏梅一个鹽少許水一大盞煎至八分溫服

獨活散 清頭目陽明邪攻注眼目牙齒斷肉腐痛兼治偏頭痛攻注眼目院方

川芎　獨活　羌活　防風各半兩　華細辛貳分
荊芥　鄆薄荷　生地黃各壹兩

右為末水煎去滓食後

導水丸 下劑

大黃　黃芩各貳兩　滑石四兩　黑牽牛四兩另取頭末用

加甘遂壹兩去濕熱腰痛泄水濕腫滿久雨則加依法製用
加白芥子壹兩去遍身走注疼痛

右爲細末噙水嗑之

又前藥

石灰壹斤千年者　龍骨四兩　刺薊壹小束

右於五月五日早晨搗爲泥作餅子放乾用

金砂流濕丸治男子婦人雜證又風濕酒濕

木通壹兩去皮　澤瀉壹兩半　木香壹兩　白茯苓去皮　大黃去皮各壹兩半

滑石五兩　海金砂五兩　牽牛頭末五兩　郁里仁壹兩

右爲細末滴水丸桐子大每服五十丸至八十丸生姜湯下

忍濕麪　如小便不通灯草湯下

如傷酒生姜湯下　酒疸食黃雞葡湯下

痢疾高良姜湯下　婦人血氣不調當歸湯下

肢節疼痛溫酒下　心痛者韮根湯下

膈氣枳實湯下　中風槐角湯下

二脫宿氣丸 治二焦痞滯氣不升降水飲停積不得流行脇下虛滿或時刺痛並宜服之

木香　青皮去白　陳皮去白　京三稜炮　白豆蔻仁各壹兩　大腹子七分半　半夏湯洗七次貳兩　縮砂仁　檳榔　沉香各半兩

右為細末水麵糊和丸如桐子大每服五十丸陳皮湯下

二十八伯散 治遠年日近發牙痛在元戎方

丁香　蓽撥　大椒　蝎稍已上各七个

右為末用津蘸擦痛處効

治大疥 栢油不以多少鐵器內熬次下鵪鴿糞雞糞細末同和加小油少許擦之

治久疥癬 以腊猪脂不以多少同生白礬杏仁少加輕粉搗爛擦之

桃紅散 貼瘡生肌止痛 張正卿傳

滑石壹兩 赤石脂參兩 黃丹貳分 同為細末乾貼

烏金散 貼惡瘡疳瘻

樣子二个內一个實黃丹一个實以白礬末相合定用黑俏麻皮纏了火內燒研細加麝香少許洗淨瘡貼之

治頸下結核不消經效

大肚蜘蛛不以幾个以好酒浸了研爛同浸的酒去滓温熱臨卧服之

治甜瘡 大棗去核實以綠礬火燒微存性研細貼之如瘡乾以小油調塗

諸瘡腫痛不可忍者以葵花根去黑皮搗爛若稠點井花水少許若不稠不須用水以紙花如膏藥貼之立效

治五種喉痺五痺散 在元戎內

大黃 白殭蠶炒各等分

右爲末每服五錢生姜自然汁蜜各半盞一處調服以利爲度

却涎散 治舌上口瘡不能食

銅綠半兩研 香白芷壹兩末

右拌勻摻舌上温醋嗽立愈

玉壺散 治二種癭

海藻 海帶 昆布 雷丸各壹兩 青塩

廣茂各半兩

右等分爲細末陳米飲爲丸椿子大噙化以煉蜜和丸亦好

治咽喉閉太師傳

薄荷 壹兩 紫荷車 半兩 甘草 叁分 炙

右爲細末煉蜜爲丸彈子大臨卧嚥化

如聖散 治惡瘡背腦疽寒癰吹奶打撲損傷並治之

甘草 壹兩半生熟 皂角 叁分燒存性去皮絞和用

右爲細末每服二錢熱酒調下無時

治風狗傷 口噙漿水洗淨以乾姜末塗貼 又方以吮去血漿水洗畢紙上炒黃丹赤色貼之

藥蛆方 以皂礬飛過乾貼其中即死

治臁瘡 趙舍傳

以葱漿水洗淨帛淹去膿囊厚貼輕粉了上用蝎牛不以多少搗爛作膏藥貼定瘡可自落

活風至寶丹 治諸風熱等證

防風壹兩半　石膏壹兩半　川芎貳兩半　滑石叁兩　當歸貳兩半
芍藥壹兩半　甘草貳兩　大黃半兩　白朮壹兩叁分　連翹半兩
荆芥穗五分　薄荷葉半兩　麻黃半兩去根不去節　山梔子六分
黃芩壹兩　芒硝半兩　桔梗　熟地黃　天麻
人參　羌活　獨活各壹兩　黃連　黃蘗
細辛各半兩　全蝎五分

右爲極細末煉蜜爲丸彈子大每服一丸細嚼茶酒任下臨臥

建功神應丹 治風癱瘓四肢不舉手足麻痺等證　汗劑也

麻黃五斤去根節河水叁斗沙鍋內熬數十沸去滓再熬成膏至半盞　甘松
蒼朮　桑白皮　吳白芷　浮萍草　川芎

苦參 已上各叁兩

右同爲細末用麻黃膏子爲劑丸如彈子大每服一丸溫酒一大盞研化臨卧服於不透風処睡汗出爲度隔五七日再服一丸大有神効不可具述　采浮萍草法

不在山不在岸採我之時七月半選甚難風当頭風些小微風都不算豆淋酒内下三錢鐵鏁頭上也出汗馬書史傳

治諸惡瘡初得發汗

槐花不以多少　皂角刺針不以多少搥碎

右將二味熬二五十沸用胡桃二个一生一燒存性細嚼以前槐花水送下可半椀許不過二五服見効

治破傷風將欲死者

川烏頭生　天南星生　半夏生　天麻去芦各等分

右為細末每服一錢豆淋酒調下稍温服次用酒一盞投之若牙噤斡開嚼之但藥得下無不活者

吐劑獨聖散

瓜蒂不以多少剉細微炒

右為細末蘆汁調下　脇痛加全蝎　頭痛加蔚金好茶中停為茶調散

常山散吐瘧

常山貳兩水煮曝乾　甘草壹兩半

水煎服空心

二知湯　以四物湯凉膈散當歸各中停水煎服浴遍身瘡疥又厲風　以滚塩水浴之極妙宋夏公尉用此良愈治血疝　川練子七个炮

為細末空心酒調下壹劾

大沉香丸 治蠱脹腹滿水腫遍身仰滿氣逆嘔噦喘乏小便赤澁大便不調一切中滿下虛危困病證其効不可具述

沉香　丁香　人參　檳榔　車前子　苦葶藶各貳分　青皮去白　陳皮去白　枳實麩炒　白牽牛　木通各四分　胡椒　木香　海金砂　蝎尾去毒　赤茯苓　白豆蔻各貳分半　蘿蔔子六分炒　白丁香壹分半　滑石叁分　郁里仁湯浸去皮壹兩貳分半

右為細末生姜自然汁為糊丸如桐子大生姜湯下日三忌鹽魚麵等

神人向魏散 遺山傳 治骨蒸傳尸等勞寒熱羸劣困倦喘嗽

右阿魏叁分研青高壹握細切東北桃枝一握細剉甘草如

病人中指許大男左女右以童子小便二升半隔夜浸藥明旦煎取一大升空心溫服分爲三服進次服調檳榔末三錢如人行十里更一服丈夫病婦人煎婦人病丈夫煎合藥時忌孝子孕婦病人及腥穢物雞犬等後忌油膩濕麵生冷硬物服至一二劑即吐出虫子或泄瀉更不須服余藥若未吐利即當盡服病在上即吐在下即利皆出虫如馬尾人髮即差萬金良藥可以當之

服藥後逐去諸疾五藏虛弱魂魄不安即以白茯苓湯補之

白茯苓壹分　人參叁分　遠志叁分去心　龍骨　防風各貳分

甘草叁分　犀角末伍分　生地黃肆分　大棗七枚　麥門冬去心四分

右以水二大盞煎作八合分三服溫服如人行五里一服仍避風寒若覺未安隔日更作一劑已上兩藥須連服之

救苦黃耆散　治諸惡瘡癰癤張郎中傳

黃耆　甘草　當歸　苡蔞根　芍藥各等分壹兩五分

懸蔞壹對　熟地黃不以多少　金銀花貳兩皂角刺針為引

右㕮咀每服五錢無灰好酒一升同引子裝於磁瓶內將瓶用笋葉封坐於鍋內上以大盆覆鍋口盆外用黃土封之毋令出氣煮之外聞藥香為度取出瓶澄定飲清將藥滓再添酒一升依前煮服若不飲酒者以水煮服若酒少者酒水各半煮服瘡在上食後臨卧在下空心服之神効

愛拜平胃散　治脾胃不和濕氣困塞嘔吐酸水氣刺氣悶脇肋虛脹腹痛腸鳴胸膈閉滯寬中進食

川厚朴　炙甘草　陳皮各叁兩　生姜四兩和皮切

蒼术五兩泔浸去皮切　棗二百个去核切

右為細末每晚臨臥刷淨牙以指醮揉熱麻擦去常用牢牙去風

【普濟方】當歸 白芷 桂 白斂 白芷 木鱉子仁 杏仁 各壹兩剉如豆 丹貢斤 油五斤 乳香 亂髮灰 沒藥 各半兩 加黃耆 叁分 當歸稍 叁分 瀝青 少許

右先將藥油內煎令焦黃濾去滓再煎清油沸下丹濕柳木篦子不住手攪熬六時辰滴於水中成圓珠子住火入沒藥乳香黃耆當歸稍末攪勻盛盒內收貯

【通玄敘】建藥

石膏 川芎 赤小豆 苡蕪 各壹分 藁盧 少許

加朴硝壹兩退熱散腫毒止痛久旱則加
加郁里仁壹兩散結滯通關節潤腸胃行滯氣通血脉
加獐柳根壹兩去腰腿沉重
右爲細末滴水爲丸如桐子大每服五七十丸或加至百丸
臨卧温水下

治大頭病兼治喉痺

人間治疫有仙方　一兩殭蚕二大黄
姜汁爲丸如彈大　井花調蜜便清凉

當歸散治血崩

當歸壹兩龍骨壹兩燒赤香附子叁分炒　椶毛灰半兩
右爲細末空心米飲調下四錢忌油膩等物

蓮殼散治血崩

乾蓮蓬燒灰存性　棕櫚皮灸毛燒灰各半兩　香附子叁兩炒

右爲細末每服四錢空心米飲調下

治喉痺并時疫毒

桔梗　甘草　升麻　連翹　黍粘子

防風　酒製黃芩

右㕮咀每服五錢水煎細嚥

防風通聖散

防風　川芎　當歸　芍藥　大黃

芒硝　連翹　薄荷　麻黃去節已上各半兩

石膏　桔梗　黃芩各壹兩　白朮　山梔子

荆芥穗各叁分　滑石貳兩　甘草壹兩

一方去芒硝加牛膝半兩酒浸人參半兩半夏半兩生姜製

右爲麤末每服一兩生姜同煎日再服
若勞汗當風爲鼓聲乃痙勞汗出於玄府脂液所凝去芒硝
加芍藥當歸
若生癮疹或赤或白倍加麻黃瑞鼓葱白出汗亦去芒硝若
依前方中加四物黃連解毒二藥合而飲之日二服
若小便淋閉去麻黃加滑石連翹煎藥湯調木香末二錢匕
若腰脇痛走痒疼痛加硝石當歸甘草一服內各二錢調車
前子末海金砂末各一錢
若破傷風每一兩加荆芥穗大黃各二錢調全蝎末一錢羌
活末一錢
若諸風潮搐小兒急慢驚風大便結秘邪熱暴甚腸胃乾燥
寢汗咬牙上竄睡語筋轉驚悸肌肉蠕動每一兩加大黃二

錢梔子二錢調茯苓二錢羌活末一錢
若風傷於肺咳嗽喘急每一兩加半夏桔梗紫菀各二錢
若打撲傷損肢節疼痛腹中惡血不下每一兩加當歸大黃
各二錢半調沒藥乳香末各二錢
若解利四時傷寒內外所傷每一兩加益元散一兩葱白十
莖鹽豉一合生姜半兩水一椀同煎五七沸溫冷服一半以
筯投之吐罷後服一半稍熱服汗出立解
若飲酒中風身熱頭痛如破者加黃連鼠二錢葱白十莖依
法立愈
若頭旋腦熱鼻塞濁涕時下每一兩加薄荷黃連各二錢半

萬應針頭丸 治一切腦背疽惡毒大瘡欲死者一粒即愈武昌
閔千户秘收此藥大都治可者八十余人

麝香叁分　血竭叁分　㕮如蠶者用　蟾酥叁分　舌試散者不用　非真　蟾酥辣者用
輕粉叁分　硇砂叁分　片腦壹分　蜈蚣壹對　全用

右為極細末煉蜜和為劑如瘡有頭者用針挑破微有血出將藥一黍米大放於挑開瘡口內上用紙花周圍唾津濕沾瘡上其藥不過時刻即愈
如兩腋見無頭瘡者即是暗丁俗云要胡是也即將兩手虎口內白土紋用針挑破如前用藥封蓋忌雞鵝酒濕麵一切發熱之物

鳥漆丹

常山壹斤剉碎酒浸一宿曬乾不見火　檳榔四兩

右同為末酒糊丸桐子大於發日當夜五更冷酒下五十丸至早辰空心又冷酒下五十丸忌食熱物一日更忌生冷硬

物葷腥濕麵等數十日如夜發者却於當日早辰午後二次依前服之

治諸積聚宜桃仁煎丸

桃仁五兩湯浸去皮尖用冰研濾取三升　荊三稜貳兩煨黃

鱉甲九肋者醋炙黃三兩　木香　檳榔　青橘皮去穰炒各壹兩

右先取桃仁汁慢火熬至二升再加好醋一升再熬如糊將余藥五味細末拌和勻丸如桐子大每服五七十丸淡醋湯下空心日二服

雜類名方

王雲五主編

叢書集成初編

局方發揮及其他一種

中華民國二十六年六月初版

發行人　王雲五　上海河南路

印刷所　商務印書館　上海河南路

發行所　商務印書館　上海及各埠

（本書校對者汪任庵）

✤E五二九二

祥